

دیگوکسین چیست؟

دیگوکسین داروی به دست آمده از گیاه دیژیتال است که در درمان بیماران مبتلا به نارسایی قلبی و برخی انواع نامنظمی های ضربان قلب استفاده می شود.

اصولا دیگوکسین از طرفی باعث افزایش قدرت انقباض قلب و از سویی دیگر سبب کاهش هدایت الکتریکی در قلب می شود.

دیگوکسین در قالب قرص، تزریق، محلول و قطره خوراکی در دسترس است.



عوارض جانبی

- ♦ بی اشتهایی تهوع و استفراغ (اثرات اولیه مسمومیت با دیژیتال)
- ♦ سردرد، احساس خستگی کابوس شبانه، فراموشکاری، انزوای اجتماعی، افسردگی و بی قراری، اختلال در هوشیاری، بدبینی، توهمات، کاهش قدرت بینایی

علامت مهم عارضه:

وجود هاله سبز یا آبی

در اطراف اشیا

(بخصوص نورانی یا دید برفی)

نحوه ی مصرف دارو :

دوز و مقدار داروی دیگوکسین از فردی به فرد دیگر متفاوت است. لذا دارو را دقیقاً همانطور که پزشک برایتان تجویز کرده است، استفاده نموده و از کم یا زیاد کردن خودسرانه مقدار و مدت زمان مصرف اجتناب نمایید.

قرص را میتوانید قبل یا بعد از غذا میل نمایید . اگر نمی توانید قرص را بطور کامل ببلعید، می توانید آن را خرد و با مایعات و غذا مخلوط کنید

داروی دیگوکسین را به طور منظم مصرف کرده و دوره درمان را کامل کنید، حتی اگر مدتی پس از مصرف این دارو احساس خوبی دارید یا علائمی ندارید.

اگر يك نوبت مصرف دارو فراموش شود، چنانچه پس از ۱۲ ساعت به یاد آورده شود، به هیچ وجه آن نوبت نباید مصرف شود و مقادیر مصرف بعدی نیز دو برابر نگردد.



راهنمای آموزش به بیمار

نحوه مصرف قرص دیگوکسین



توجه:

قبل از تجویز دارو نبض را به مدت یک

دقیقه کنترل کنید.



نبض رادیال

ISNA

PHOTO: ISNA

منبع: فارماکولوژی رامین خدام

شماره تماس بیمارستان شهید حسین

پور لنگرود : 01341564001

اگر به مدت دو روز یا بیشتر مصرف دارو فراموش شود، باید به پزشک مراجعه شود.

از قطع ناگهانی داروی دیگوکسین بپرهیزید. توقف ناگهانی این دارو ممکن است وضعیت شما را بدتر کند.

هرگز داروی دیگوکسین را به فرد دیگری حتی با علائم مشابه خودتان تجویز نکنید.

در مدت درمان با داروی دیگوکسین در زمانهای مقرر به پزشک خود مراجعه نموده و آزمایشات تجویزی را به طور منظم انجام دهید.

در مدت درمان با داروی دیگوکسین، فشار خون و ضربان قلبتان را به صورت روزانه بررسی کنید.

علامت مسمومیت :

در صورت بروز هر گونه نشانه مسمومیت از جمله تهوع، استفراغ، اسهال، کاهش اشتها یا آهسته شدن شدید نبض، باید به پزشک مراجعه شود. (کمتر از 60 بار در دقیقه)

کارگروه آموزش سلامت

بیمارستان شهید حسین پور لنگرود

بهار ۱۴۰۴