



دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی شیراز

به نام خدا

بیمارستان شهید حسین پور لنگرود

عوارض حین دیالیز



گروه هدف: بیماران دیالیزی

کارگروه آموزش سلامت

بهار ۱۴۰۴

سردرد: شایعترین علت سندرم عدم تعادل است

درمان: استامینوفن می توان داد

خارش: خارش یک مشکل شایع در بیماران دیالیزی است. حین

دیالیز ایجاد یا بدتر میشود. گاهی تنها حین دیالیز ایجاد می شود.

درمان: -نرم کننده و مرطوب کننده-آنتی هیستامین کمک کننده است .

هایپوگلیسمی: یک واقعه نادر است. اغلب در افراد دیابتی رخ می

دهد. اگر غلظت گلوکز مایع دیالیزیت کمتر از ۲۰۰ باشد، رخ می

دهد. اگر در فردی دیده شد، باید انسولین قبل از دیالیز کاهش یابد.

علامت: تعریق سرد، تپش قلب، رنگ پریدگی، کاهش هوشیاری

درمان: تزریق ۵۰ سی سی گلوکز هایپر تونیک

منبع: کتاب پرستار و دیالیز

کرامپ عضلانی :

عوامل مستعد کننده شامل افت فشار خون، کاهش حجم، سرعت اولترافیلتراسیون بالا و بکار بردن محلول دیالیز با سدیم پایین می باشد.

درمان:

نرمال سالین - ماساژ



تهوع و استفراغ: در اغلب موارد به دلیل افت فشار خون است

میتواند به دلیل سندرم عدم تعادل باشد

پیشگیری: اجتناب از افت فشار خون

مقدمه:

کلیه ها خون را از بدن تصفیه می کنند و مواد زائد را از خون جدا می کنند و آن را به صورت ادرار از بدن دفع می کنند حال اگر کلیه ها با مشکل مواجه شوند این روند از طریق فرایندی به نام دیالیز صورت می گیرد و توسط این فرایند مواد زائد از بدن خارج می شوند.

عوارض حین همودیالیز

۱- افت فشار خون

۲- تهوع و استفراغ

۳- خارش

۴- اسپاسم عضلانی

۵- سردرد، کمر درد، درد سینه

۶- تب و لرز

۷- سندرم عدم تعادل

۸- واکنش به دیالیزر و محلول های دیالیز

۹- مشکلات قلبی

۱۰- خونریزی و همولیز

علل افت فشار حین همودیالیز

۱- علل مرتبط با حجم

۲- انقباض ناکافی عروق

۳- فاکتورهای قلبی

۴- علل ناشناخته

علل افت فشار حین همودیالیز:

سرگیجه - احساس سبکی سر تهوع - کرامپ عضلانی - کاهش هوشیاری - تاری دید

پیشگیری از افت فشار خون:

اجتناب از مصرف بیش از حد نمک و افزایش وزن بیش از یک کیلوگرم -

داروهای ضد فشارخون را بعد از دیالیز بخورد

اجتناب از مصرف غذا حین دیالیز

استفاده از میدودرین

